

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

IMP. LILLE 62.01451

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST (Tél. Arras 23-14)  
(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux.  
C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL  
12 NF

n° XXI  
- 8 Juin 1962 -

## AVERTISSEMENTS

### - PEGOMYIE -

### BETTERAVES

Des pontes importantes sont déposées notamment dans le Pas de Calais et le Cambrésis depuis le 6 Juin. De plus, les éclosions consécutives aux pontes précédentes évoluent très rapidement. Or, cette année, toute galerie risque d'être préjudiciable à la végétation.

En conséquence, dans tous les champs où l'on constate plusieurs oeufs par feuille, il y a lieu d'envisager un traitement :

- 1) immédiatement si des galeries sont déjà visibles,
- 2) sinon, dès le début des éclosions.

REMARQUE : PUCERONS - Les premières colonies de pucerons noirs sont observées localement. Le vol des pucerons verts, qui transmettent la jaunisse, a débuté. L'I.T.B. transmettra aux planteurs des Avis de Traitements dès que la pullulation sera jugée dangereuse. Cependant, dans tous les cas où un traitement "Pégomyie" est nécessaire, il y a grand intérêt à choisir un produit à action mixte valable également contre les pucerons.

### .. TAVELURES DES FRUITS A PEPINS -

### CULTURES FRUITIERES

Quelques taches risquant d'apparaître, effectuer un traitement soigné du 12 au 14 Juin. Dans les vergers où aucune tache ne sera visible à la date du 18 juin, cette opération sera la dernière dirigée principalement contre ces maladies.

RAPPELS - Traitement systémique contre pucerons et acariens.

- OIDIUM DU POMMIER : la lutte préventive doit être soignée dès maintenant. Elle consiste à effectuer un traitement dès que les températures dépassent 20°, opération renouvelée tous les 8 - 10 jours si besoin est, jusqu'à nouvel Avis. (bien entendu, la protection est interrompue quand les températures sont inférieures à 20°)

### - INFORMATIONS -

COLZAS DE PRINTEMPS : Bien surveiller les cultures qui sont envahies par les Meligèthes. Intervenir avant la floraison dès que l'on constate au moins 4 ou 5 Meligèthes par hampe.

THRIPS DU LIN : Le réchauffement actuel va favoriser leur pullulation. Intervenir rapidement si besoin est. (pour juger un champ : le matin à la rosée, "faucher" le lin avec la main ouverte - le seuil dangereux est de l'ordre de 4-5 Thrips collés sur la main - les Thrips sont de petits insectes noirs allongés de 1 à 2 mm de long).

MILDIU DE LA POMME DE TERRE : Une possibilité d'apparitions de quelques taches existe vers le 10-12 Juin en situation très favorable au champignon (proximité de tas de déchets, jardins abrités ...) Un traitement généralisé ne se justifie pas encore mais il est nécessaire de surveiller attentivement "les coins à mildiou". Ne pas oublier de prévenir immédiatement la Station et éventuellement d'envoyer un échantillon.

REMARQUE VALABLE UNIQUEMENT POUR LA REGION HAM - St-QUENTIN - PERONNE : Si le temps devient orageux avec tendance à la pluie, les agriculteurs qui ne veulent prendre aucun risque et qui n'hésitent pas à effectuer un traitement supplémentaire (qui s'avérera peut-être superflu) peuvent effectuer un premier traitement du 11 au 13 Juin sur les cultures hâtives placées en situation habituellement favorable au mildiou.

Le Contrôleur : R. DIVOUX

L'Inspecteur : P. COUTURIER